

Les papillons

Azuré de la Sanguisorbe

- Taille : 16 à 18mm
- Couleurs :
mâle : bleu
femelle : bleu foncé

Description :

C'est un insecte. Ses ailes avant mesurent de 16 à 18 mm de long et ont 3 à 4 points noirs. Le mâle a des ailes bleues brillantes sur le dessus et brunes dessous. La femelle a des ailes bleues foncées avec des bordures noires sur le dessus et brunes dessous.

Comportement :

Les chenilles se nourrissent de la fleur de Sanguisorbe durant vingt jours puis de larves de fourmis avant de se métamorphoser en papillon.

Habitat :

Il vit dans des prairies humides.
exemple : des bas-marais où se trouvent des Sanguisorbes.

Reproduction :

Les femelles déposent leurs petits œufs blancs qui éclosent au bout de quatre à dix jours sur une plante, la Sanguisorbe. La larve reste deux à trois semaines sur la fleur, puis se laisse tomber au sol où elle est récupérée par les fourmis. La larve se développe alors dans la fourmilière.

Azuré des Paluds

- Taille : 16 à 18 mm
- Couleur : Mâle et femelle : bleu foncé

Description :

L'azuré des Paluds est un insecte. Il mesure 16 à 18 mm de large. La femelle a des ailes brunes dessus et dessous. Le mâle a le dessus des ailes bleu foncé et le dessous brun.

Cuivré des marais

- Taille : 13 à 20 mm
- Couleur : orange, cuivré, noir

Description :

Le cuivré des marais est un insecte qui mesure de 13 à 20 mm de large lorsque ses ailes sont ouvertes. Le dessus des ailes est cuivré à orange avec un bord noir. Le mâle a une tache noire au milieu de l'aile avant, la femelle en a plusieurs.

Comportement :

les chenilles se nourrissent de feuilles d'oseille. Les adultes butinent les fleurs de menthe, de salicaire ou d'épatoire chanvrine ainsi que de grande berce.

Habitat :

Il vit dans des zones humides entre 800 et 1200 mètres d'altitude.

Reproduction :

Après l'accouplement, les femelles pondent leurs œufs sur les feuilles de diverses oseilles sauvages. L'œuf éclot au bout de dix jours.

Répartition géographique



Azuré de la Sanguisorbe : Il est présent dans l'est de la France (Lorraine, Alsace...), dans la vallée de la Loire et les marais charentais.



Azuré des Paluds : En France, il est uniquement présent sur la bordure est du pays (de la Moselle à la Savoie).



Cuivré des marais : espèce dont l'aire de présence est morcelée dans toute la France

Ce dont ils ont besoin :

Les papillons ont besoin de prairies contenant de la Sanguisorbe et de l'oseille.



Les menaces qui pèsent sur eux :

- Sur la reproduction et l'alimentation :

Si on fauche la Sanguisorbe alors qu'elle est en fleur ou si les vaches et les chevaux la mangent, la larve ne trouvera plus de quoi se nourrir.

- Sur l'habitat :

L'assèchement des zones humides entraîne la disparition de l'habitat des papillons.



Photo: François Spill

Comment les protéger :

Pour que les papillons puissent se développer dans de bonnes conditions, il faut faucher les prairies et les bords de route un mois avant l'envol des papillons (mi-juin) et faire la deuxième fauche plus tardivement (mi-septembre).

HEIN Amélie & FUCHS Camille